

患者様各位

お知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。

さてこの度、当院では4月1日(土)より再来初診の設定と、薬剤情報提供書のフォーマット変更をいたしました。詳しくは下記の詳細をご覧ください。

患者様におかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程お願い申し上げます。

敬具

記

■再来初診について

4月1日(土)より下記に該当される方は、初診料とさせていただきます。

- ・過去に受診したことがあるが、治療期間が終了した後、6カ月が経過して再び来院された場合
- ・患者様が任意に治療を中断し、最終来院日より6カ月が経過した場合

※医師から診察スケジュールを指定された場合は該当しません

■薬剤情報提供書フォーマット変更について

お薬を処方する際に、お薬の名称、効能・効果、用法、用量、副作用などの注意事項が書かれたお薬の説明書を配布しておりますが、4月1日(土)よりフォーマットが変更となります。

それに伴い、電子用お薬手帳のQRコードが廃止となります。

変更前

☆ 八王子 花子 様のお薬の説明書です ☆ 51

他の病名、併発病に併用するお薬、副作用等でお薬に影響的なお薬は「併用注意」の欄を併せて下さい。

ID No. 1002 受付番号 指導日 2011年9月6日 内科

1. カルスロット錠20 (淡橙黄)

錠	薬の作用	注意事項
起床 朝 昼 夕 寝前	血管を弛げ血圧を下げます。カルシウム拮抗薬と呼ばれています。	●めまい、ふらつきがりますので注意下さい。をやめると症状が悪化します。グレープフルーツ：用が強くなる場合があります。

232:20/ 23220:20 1日1回朝薬後 14日分

2. タナトリル錠5 (白 (割線模様))

錠	薬の作用	注意事項
起床 朝 昼 夕 寝前	末梢の血管を弛げて血圧を下げ、心臓の働きも助けます。ACE阻害薬と呼ばれています。	●めまい、ふらつきがりますので注意して下さい。妊娠の可能性のある婦、み、息切れ、腫や舌のいるなどの症状が現れたら、

TA135:5/ TA1355 1日1回朝薬後 14日分

3. ラシックス錠20mg (白)

変更後

999999911
テスト イチニイチヨ
テスト 1214

お薬情報 (3種類) 令和

No.	薬剤名	効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	寝	注意事項
1	テラレックス錠5mg	持続的にヒスタミンH1受容体においてヒスタミンとの拮抗作用を示すことによりアレルギー症状を抑えます。通常、アレルギー性鼻炎、じんましん、皮膚疾患(蕁麻疹、皮膚掻痒病)に伴うかゆみの治療に用いられます。		1	1	1	1	1	アレルギーの有無を調べる検査を受ける場合には、皮膚反応しますので、検査の3~5日前中止されます。
2	アラミト点鼻液2.7、5μg/50噴霧用 3mg/6g	抗炎症作用、抗アレルギー作用を示し鼻粘膜のヒスタミン受容体減少させる。		1	1	1	1	1	1日1回就寝時 通常1回各鼻腔に2噴霧を1日1回繰り返す。

【お問い合わせ】